

うええん
ママ、ゲボした

子供が薬を吐いてしまったら

子供の胃は大人に比べて小さく、筒状に近いことから吐きやすく、胃腸炎を起こしていなくても、咳や大泣き、満腹などがきっかけで吐くことはよくあることです。

薬を飲ませた後に吐いてしまったら、もう一度飲ませるべきか判断に迷います。一般的な対応について、以下にまとめました。



だいじょうぶだよ
もう一回のもっか



(1) 服用後30分以内に吐いてしまった場合

薬を飲んだ直後に吐いてしまった場合や、しばらく経って吐いた場合で明らかに薬が出たときは、もう一度同じ量の薬を飲ませます。吐いた後30分くらい休憩し、吐き気がおさまってから飲ませましょう。

(2) 服用後30分以上経ってから吐いてしまった場合

薬を飲んでから30分以上経ってから吐いてしまった場合は、すでに体に吸収されていると考えられ、再度飲ませない方がよいとされています。



※子供が吐いてしまうと、ご家族に焦りが出てしまい、その気持ちが子供に伝わってしまうことがあります。子供が安心して薬を飲めるように、ゆったりとした気持ちで飲ませるように心がけましょう。うまく飲めたらほめてあげることが大切です。判断に迷う場合は主治医または薬剤師にご相談ください。